

Nutzen der Beschichtung bei Koronarstents fraglich

m -- Stettler C., Wandel S., Allemann S. et al. Outcomes associated with drug-eluting and bare-metal stents: a collaborative network meta-analysis. Lancet 2007 (15. September); 370: 937-48

[\[LINK\]](#)

Zusammenfassung: Peter Ritzmann

Eine weitere Meta-Analyse der Studien mit medikamentenbeschichteten Koronar-Stents liefert diese Schweizer Arbeit. Ähnlich wie frühere Analysen (siehe: infomed-screen Nummer 3, 2007) zeigt sie, dass die Sterberate von der Beschichtung des Stents nicht beeinflusst wird. Zusätzlich anderer Endpunkte finden sich Unterschiede, die nicht einfach zu interpretieren sind: Myokardinfarkte waren seltener nach Sirolimus-beschichteten Stents als nach unbeschichteten oder Paclitaxel-beschichteten Stents. Spätere Stent-Thrombosen waren häufiger nach beschichteten, insbesondere mit Paclitaxel beschichteten Stents. Andere Faktoren, wie z.B. Unterschiede in der Art und Dauer der antithrombotischen Medikation, könnten zu den widersprüchlichen Resultaten beigetragen haben. Dieses Kapitel ist noch nicht geschlossen.