

Prävention von Ulkusblutungen unter COX-2-Hemmern

r -- Chan FK, Wong VW, Suen BY et al. Combination of a cyclo-oxygenase-2 inhibitor and a proton-pump inhibitor for prevention of recurrent ulcer bleeding in patients at very high risk: a double-blind, randomised trial. Lancet 2007 (12. Mai); 369: 1621-6

[\[LINK\]](#)

In dieser Doppelblindstudie wurde untersucht, ob durch Zugabe von Esomeprazol (Nexium®) das Risiko, unter COX-2-Hemmern eine Ulkusblutung zu erleiden, reduziert werden kann. Rund 270 Personen, die unter nicht-selektiven nicht-steroidalen Entzündungshemmern eine Ulkusblutung erlitten hatten, erhielten nach Abheilung des Ulkus Celecoxib (Celebrex®; 400 mg täglich); je die Hälfte erhielt Esomeprazol (40 mg täglich) oder Placebo für 12 Monate. In den 13 Monaten, in denen die Studienteilnehmenden beobachtet wurden, traten in der Placebogruppe 12 (9%) klinisch manifeste, endoskopisch bestätigte Ulkusblutungen auf, während es in der Esomeprazol-Gruppe zu keinen Blutungen kam.